

sau pe terenurile de camping agreate, dacă aceste tehnici și practici sunt permise de reglementările în vigoare).

6. Indicatorii de supraveghere și evaluare a programelor de acțiune

1. Indicatorii de supraveghere și de evaluare a programelor de acțiune trebuie să arate avansarea resorbției de azot excedentar provenind din dejecții, precizând care dintre diferitele modalități de resorbție puse în funcțiune pentru a atinge acest obiectiv au fost eficiente. Unul dintre indicatorii obligatorii este conținutul în nitrați al apelor subterane și de suprafață, măsurați în puncte de monitorizare stabilite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului-ICPA București și Administrația Națională „Apele Române” .

2. Lista indicatorilor va putea fi completată ulterior în funcție de dispozițiile și de reglementările la nivel național sau local. Indicatorii trebuie să permită măsurarea gradului de atingere a obiectivelor fixate ale programelor de acțiune.

Sindatul ocupării terenurilor cu culturi	Ingrășăminte	L u n a																																			
		I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
		1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31			
Soluri necultivate	G																																				
	M																																				
	L																																				
Culturi înfințate toamna	G																																				
	M																																				
	L																																				
Culturi înfințate primăvara	G																																				
	M																																				
	L																																				
Culturi de ierburi perene**	G																																				
	M																																				
	L																																				

**înfințate de peste 6 luni

G - gunoi de grajd

M - mirază

L - dejecții lichide

- perioadă interzisă pentru îngrășărea îngrășămintelor

⊗	↗ nu se aplică îngrășăminte organice și minerale cu azot la distanță mai mică de: - minim 5-6 m de cursurile de apă (formele solide); - minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide și semilichide); - minim 100 m de captările de apă potabilă; ↗ nu se aplică îngrășăminte pe solurile și terenurile; - cu pantă mare (pe terenurile în pantă, arabile, pășini, fânețe, pomi și vii îngrășăminte se aplică numai cu recomandarea expresă a inspectorului pentru ZVN/ZPVN, având în vedere caracterul special al fertilizării terenurilor în pantă); - puternic înghețat; - crăpat în adâncime; - cu drenuri introduse în ultimele 12 luni; ↗ se evită aplicarea îngrășămintelor organice și/sau minerale: - pe timp de ploaie; - ninsoare; - soare puternic; - pe terenuri cu exces de apă; - pe solurile acoperite cu zăpadă
---	--

Data medie a primului și ultimului îngheț

1.	Primul îngheț	septembrie
	Ultimul îngheț	mai

La aplicarea îngrășămintelor sunt posibile derogări de la perioadele de interdicție, care se stabilesc pentru fiecare agricultor în funcție de planificare executării arăturii (toamna sau primăvara) și de gama de culturi practică.

Derogările, stabilite numai împreună cu specialistul desemnat pentru zona dv. sunt în general:

 DEROGĂRI	- aplicarea bălegarului și a unor sortimente de îngrășăminte minerale (fosfor și potasiu) pe solurile care se ară până la instalarea înghețului, în mod deosebit pe solurile luto-argiloase și argiloase pe care gerul contribuie la îmbunătățirea structurii; - înființarea până la cel mai târziu 15 septembrie a unei culturi consumatoare de azot și care se recoltează până la cel mai târziu 15 noiembrie
PE PARCELE CARE BENEFICIAZĂ DE DEROGARE SE APLICĂ OBLIGATORIU MONITORIZAREA LOCALĂ A EVOLUȚIEI NITRAȚILOR PE PROFILUL SOLULUI	

3. Fermele de creștere a animalelor, au obligația ca la stabilirea mărimii maxime de creare și extindere să se aibă în vedere un anumit procentaj din cantitatea de azot (kg azot produs de animale) care poate fi resorbit în ZVN sau ZPVN. Acestea se stabilesc de grupul de lucru în ZVN/ZPVN și cuprind sau reactualizează la nevoie în planul de acțiune.

4. Programele de dezvoltare rurală pentru localitățile cuprinse în ZVN sau ZPVN vor avea în vedere sprijinirea dezvoltării agriculturii durabile cu componenta ecologică prin:

- sprijinirea și dezvoltarea agriculturii ecologice,
- conversia unor terenuri la metode ecologice pentru producerea de legume, fructe, plante medicinale, culturi furajere și pășuni naturale, produse derivate de origine animale;
- garantarea calității produselor de către organism de inspecție și certificare;
- programe de instruire pentru sensibilizarea, instruirea și consilierea agricultorilor din ZVN/ZPVN.

6.3 Amestecuri de ierburi recomandate pentru reînsămânțarea sau supraînsămânțarea pajiștilor

Se vor executa lucrări de reînsămânțare sau supraînsămânțare doar acolo unde este necesar, iar amestecul va conține specii de graminee și leguminoase perene de pajiști pretabile condițiilor staționale și modului de folosire.

Se are în vedere modul de utilizare ca pășune, ca fânețe sau mixtă.

Se recomandă un amestec de 70% graminee și 30 % leguminoase /ha folosind 21-28 kg samântă/ha pentru reinsamantare.

Un amestec optim pentru pajiștile utilizate ca pășune, este format din *Phleum pratense* 8 kg, *Festuca rubra* 7 kg, *Poa pratensis* 3 kg și *Trifolium repens* 3 kg.

Pe terenurile cu folosință fânețe sau mixtă se recomandă amestecul din *Dactylis glomerata* 4 kg, *Festuca pratensis* 8 kg, *Phleum pratense* 10 kg, *Trifolium repens* 3 kg și *Trifolium pratense* 3 kg.

Supraînsămânțarea se recomandă și pe parcelele unde s-a erbicidat selectiv pentru distrugerea speciilor daunatoare. Cantitatea de sămânță/ha utilizată este proporțională cu procentul de suprafață de goluri raportat la norma de 28 kg/ha sau 21 kg/ha.

Supraînsămânțarea se recomandă de asemenea pe parcelele în care speciile valoroase sunt sub 50% din covorul ierbos.

Reînsămânțare se va face pe parcelele fără covor ierbos, pe cele cu carări de vite, pe care s-au adunat pietrele, pe cele pe care s-a eliminat vegetația lemnoasă, pe care s-au efectuat lucrări de combatere a eroziunii solului și pe care s-a făcut erbicidare totală pentru combaterea vegetației arbustive invazive.

Reînsămânțarea este recomandată pe suprafețele distruse de porcii mistreți pentru a fi repuse în valoare.

O metodă recomandată de îmbunătățire a covorului ierbos, este autoînsămânțarea adică la o perioadă de 4-6 ani se recoltează păștea prin cosire, mai târziu, după coacerea semințelor speciilor valoroase din covorul ierbos.

Amestecul de ierburi recomandate pentru reînsămânțarea sau supraînsămânțarea pajistilor.

Câteva date necesare pentru alcătuirea amestecurilor de graminee și leguminoase perene în condiții de neirigare

Specia	Regiunea de cultura						Particularitati biologice				Modul de folosinta principala	Norma de samanta (kg/ha)
	Campi e	Dealuri		Munt e	Alpi n	Lunci	Talia	Otavir e	Capacitatea de concurenta			
		uscate	umede						Anul I	Ceialti ani		
<i>Agropyron pectiniflor</i>	+	+	+	+	+	+	mijlocie	slaba	III	II	faneata	16-18
<i>Bromus inermis</i>	+	+	+	+	+	+	inalta	slaba	III	II	faneata	30-35
<i>Dactylis glomerata</i>	+	+	+	+	+	+	inalta	buna	III	I	mixt	20-25
<i>Festuca arundinacea</i>	+	+	+	+	+	+	inalta	buna	III	I	faneata	25-30
<i>Festuca pratensis</i>	+	+	+	+	+	+	mijlocie	buna	II	III	mixt	25-30
<i>Festuca rubra</i>	+	+	+	+	+	+	joasa	slaba	III	III	pasune	20-25
<i>Lolium perenne</i>	+	+	+	+	+	+	joasa	buna	I	II	pasune	25-30
<i>Phleum pratense</i>	+	+	+	+	+	+	inalta	buna	III	III	mixt	15-18
<i>Poa pratensis</i>	+	+	+	+	+	+	joasa	slaba	III	II	pasune	12-15
<i>Lotus corniculatus</i>	+	+	+	+	+	+	joasa	buna	III	III	mixt	12-16
<i>Medicago sativa</i>	+	+	+	+	+	+	inalta	buna	I	I	faneata	18-20
<i>Onobrychis viciifolia</i>	+	+	+	+	+	+	inalta	slaba	III	III	faneata	80-100
<i>Trifolium pratense</i>	+	+	+	+	+	+	inalta	buna	II	II	faneata	16-20
<i>Trifolium repens</i>	+	+	+	+	+	+	joasa	buna	III	III	pasune	10-12

+ se recomandă a fi semănate *nu se recomandă
 I – capacitate mare de concurență
 II – capacitate mijlocie de concurență
 III – capacitate mică de concurență

6.4 Capacitatea de pășunat

Capacitatea de pășunat calculată la capitolul 5 ca rezultat din determinările din sezonul de pășunat 2019 coroborat cu datele statistice de la Primaria Păusești-Maglasi și cu informațiile oferite de utilizatorii de pajiști.

S-au făcut determinări în mai multe puncte producția medie fiind cuprinsă între 10200 kg /ha și 7100 kg /ha, media ponderată raportată la unitățile de exploatare se încadrează spre valoarea de 10200 kg/ha. Aceasta valoare este folosită în calcule.

Ca urmare a fertilizării și aplicării lucrărilor recomandate și a practicării pășunatului rațional va crește atât producția de masă verde cât și coeficientul de folosire a pajiștii.

Situația actuală:

Din observațiile efectuate constatat că producția medie de masă verde a variat între 7100 kg / ha și 10200 kg/ha

S-au făcut următoarele calcule:

1. Pentru producția maximă determinată.

$$Cp(UMV/ha) = \frac{Pt(kg/ha) \times Cf\%}{Nz \times DZP \times 100}$$

în care: Nz = necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal = 65 Kg/zi;

DZP = numărul zilelor sezonului de pășunat = 180

Cf = coeficient de folosire a pajiștii, în %.

Pt = 10200 kg / ha

Rn = 1530 kg/ha

$$Cf(\%) = \frac{Pt(kg/ha) - Rn(kg/ha)}{Pt(kg/ha)} \times 100$$

$$Cf(\%) = \frac{10200 - 1530}{10200} \times 100 = 85,00 \%$$

$$Cp(UMV/ha) = \frac{10200 \times 85,00}{65 \times 180 \times 100} = 0,741$$

1 .Pentru producția maximă determinată.

$$Cp(UMV/ha) = \frac{Pt(kg/ha) \times Cf\%}{Nz \times DZP \times 100}$$

În care: Nz = necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal = 65 Kg/zi;

DZP = numărul zilelor sezonului de pășunat = 180

Cf = coeficient de folosire a pajiștii, în %.

Pt = 7100 kg / ha

Rn = 1065 kg/ha

$$Cf(\%) = \frac{Pt(kg/ha) - Rn(kg/ha)}{Pt(kg/ha)} \times 100$$

$$Cf(\%) = \frac{7100 - 1065}{7100} \times 100 = 85,00 \%$$

$$Cp(UMV/ha) = \frac{7100 \times 85,00}{65 \times 180 \times 100} = 0.516$$

6.5 Organizarea pășunatului pentru diferitele specii de animale

PLAN OPTIM DE PĂȘUNARE

Tabelul 5.1

Nr. crt.	Trup de pajiste	Suprafat a pe trupuri de pajisti (ha)	Productia medie de masa verde (kg/ha)	Coeficien t de folosire a pajiștii	Durata sezonulu i de pasunat	Capacitate a de pasunat
				%	Zile	UMV /ha
1	Trup Valea Cheii	16.52	8000	85	180	0.581
2	Trup Saracinești	48.94	10200	85	180	0.741
3	Trup Bunești	9.15	7100	85	180	0.516
4	Trup Vezuri	59.73	9800	85	180	0.712
5	Trup Rude	15.77	9700	85	180	0.705
6	Trup Vlaicu Vale+Deal	40.43	9000	85	180	0.654
7	Trup Parlacu	25.75	10000	85	180	0.726
8	Trup Mosoroasa-Paraula	24.42	9500	85	180	0.690
9	Trup Sanda	19.21	8000	85	180	0.581
10	Trup Camp Saracinești	64.88	9800	85	180	0.712
11	Trup Coasta Luncii	7.72	9500	85	180	0.690
12	Trup Muscel	10.35	7300	85	180	0.530
13	Trup Valea Cheii	9.43	9600	85	180	0.697
14	Trup Bradeanu	12.05	9500	85	180	0.690
15	Trup Poenile Ceuseștilor	5.46	9100	85	180	0.661

16	Trup Lazut	5.02	9900	85	180	0.719
17	Trup Aninis	7.54	8200	85	180	0.596
18	Trup Magher	12.14	9800	85	180	0.712
19	Trup Valea Cometului	24.17	8200	85	180	0.596
20	Trup La Troita	4.25	7200	85	180	0.523
21	Trup Plopsor-Intre Vii-Lacul Secerat	26.00	7300	85	180	0.530
22	Trup Dealul lui Iepure	6.16	7200	85	180	0.523
23	Trup Fantana Matusii	1.18	8500	85	180	0.618
24	Trup Ruget	16.95	9500	85	180	0.690
25	Trup Dos + Valeaa Viei	7.29	7900	85	180	0.574
26	Trup Oromulu	1.50	9500	85	180	0.690
27	Trup Portari	5.76	9900	85	180	0.719
28	Trup Gibulescu	4.08	9300	85	180	0.676
29	Trup Ergulesti	7.48	9200	85	180	0.668
30	Trup Liliaci	3.45	9200	85	180	0.668
31	Trup Fantana lui Bajan	4.20	9500	85	180	0.690
32	Trup Neamtu	6.01	8900	85	180	0.647
33	Trup Brezana	2.42	7200	85	180	0.523
34	Trup Balanesti	3.27	7500	85	180	0.545
35	Trup Valea Humii	4.28	7200	85	180	0.523
36	Trup Coasta Luncii	6.01	9800	85	180	0.712
37	Trup Hogesti	2.54	9000	85	180	0.654
38	Trup Lacul lui Bajan	2.29	9700	85	180	0.705
39	Trup Pietrari	13.67	8600	85	180	0.625
40	Trup Coasta	7.10	8100	85	180	0.588
41	Trup Bratan	5.81	8500	85	180	0.618
42	Trup Sub Barzei	3.73	7300	85	180	0.530
43	Trup Geana	2.92	7500	85	180	0.545
44	Trup Dealul Inalt	2.20	7100	85	180	0.516

45	Trup Dealul Popii	13.19	7500	85	180	0.545
46	Trup Nisip	2.07	7100	85	180	0.516
47	Trup Curaturi	16.78	7200	85	180	0.523
48	Trup Sulgerie	1.79	9800	85	180	0.712
49	Trup Mutuligesti	5.51	8500	85	180	0.618
50	Trup Mandoiu	8.22	8000	85	180	0.581
51	Trup Valea de Case	13.71	9700	85	180	0.705
52	Trup Floricel	5.84	9800	85	180	0.712
53	Trup Plese	8.20	8000	85	180	0.581
54	Trup Balanu-Secaturi	34.61	9700	85	180	0.705
55	Trup Socet	5.22	8500	85	180	0.618
56	Trup Corlate	26.15	9800	85	180	0.712
57	Trup Pod	8.02	9500	85	180	0.690
58	Trup Livezi	34.59	9700	85	180	0.705
59	Trup Malul Caprei	3.20	7600	85	180	0.552
60	Trup Sub Vii	2.87	7600	85	180	0.552
61	Trup Sub Trand	7.32	8200	85	180	0.596
62	Trup Prisaci	6.18	7500	85	180	0.545
63	Trup Apa Sarata	3.90	9100	85	180	0.661
64	Trup Moara lui Purece	1.29	8300	85	180	0.603
65	Trup Lot	3.78	8400	85	180	0.610
66	Trup Podu Rosu	2.73	9700	85	180	0.705
67	Trup Vale Sangerisului	6.01	9800	85	180	0.712
68	Trup Fantana Rece	5.02	9900	85	180	0.719
69	Trup Capul Dealului	29.70	9300	85	180	0.676
70	Trup Surle+Viezuini	24.95	9500	85	180	0.690
71	Trup Zbriglezi	13.79	8100	85	180	0.588
72	Trup Ciolpani	5.91	8200	85	180	0.596
73	Trup Pariul lui Vilau	13.48	8100	85	180	0.588
	TOTAL	883.24	9045	85	180	0.657

Parcellele de exploatare propuse sunt delimitate de limite naturale, sunt cai de acces catre adăposturi, cate sursele de apa si catre sate.

S-a constatat ca efectivele de animale diferă de la an, ca urmare este necesar ca in fiecare an la inceputul sezonului de pasunat sa se stabileasca numarul de UVM al grupei de animale care urmeaza sa fie repartizate pe fiecare unitate de exploatare.

Aceasta se face completand tabelul urmator:

Nr. crt.	Specificare	Numarul de animale- capete	Coeficient de transformare in UVM	TOTAL UVM
1	2	3	4	5 (col 3x col 4)
1	Vaci		1	
2	Tauri		1	
3	Alte bovine peste 2 ani		1	
4	Ecvidee de mai mult de sase luni		1	
5	Bovine între sase luni si doi ani		0.6	
6	Bovine de mai putin de sase luni		0.4	
7	Ovine		0.15	
8	Caprine		0.15	
9	Scroafe reproducătoare > 50 kg		0.5	
10	Alte porcine		0.3	
11	TOTAL	X	X	

In cazul in care TOTAL UVM (rand 11, coloana 5) se incadreaza in limitele din PLANUL DE PASUNARE, se poate pășuna cu grupa de animale întreaga suprafață.

In cazul in care TOTAL UVM (rand 11, coloana 5) nu se incadreaza in limitele din PLANUL DE PASUNARE, sunt 2 posibilități :

1.Totalul UVM al grupei de animale este mai mic decât limita minima (coloana 4 din planul de pășunare) o parte din suprafață va fi cosită. Această suprafață se determină împărțind diferența dintre limita minimă si totalul UVM calculat la 0,3.

2. Totalul UVM al grupei de animale este mai mare decât limita maximă (coloana 6 din planul de pășunare), se va reduce grupa de animale pentru a se încadra în planul de pășunare.

Exemplu: pentru unitatea de exploatare – Valea Cheii în suprafață 16,5201 ha grupa de animale care poate fi pășunată poate totaliza între 9,6 și 12,00 UVM

Cazul 1.

Dacă grupa de animale totalizează mai puțin de 9,6 UVM (de exemplu 8 UVM) , suprafața ce trebuie cosită este de :

$$(9,60 \text{ UVM} - 8 \text{ UVM}) : 0,3 \text{ UVM/Ha} = 1,60 \text{ UVM} : 0,3 \text{ UVM/Ha} = 5,33 \text{ ha}$$

Cazul 2

Dacă grupa de animale totalizează mai mult de 12 UVM (de exemplu 15 UVM) , grupa de animale trebuie redusă cu 3 UVM

$$15 \text{ UVM} - 12 \text{ UVM} = 3 \text{ UVM}$$

Având în vedere durata sezonului de pasunat de 180 de zile, durata de refacere a vegetatiei după pasunat cuprinsă între 30 și 40 de zile, durata pasunatului pe o parcelă este de 4 – 7 zile se determina numărul de cicluri de pasunat.

Ciclul de pasunat reprezintă perioada după care se revine pe aceeași parcelă în același sezon de pășunat și cuprinde durata de pasunat (4-7 zile) și durata de refacere a covorului ierbos (30-40 zile) sau altfel spus numărul de zile în care animalele pășunează efectiv pe o suprafață de pajiște, precum și timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren și până la reintroducerea lor la pășunat pe aceeași suprafață

S-a luat în calcul 42 zile (6 + 36)

Nr de cicluri de pasunat = Durata sezonului de pasunat/ (durata pasunatului+ durata de refacere)

Suprafata parcelei de exploatare se imparte in subparcele de pasunat care asigura necesarul de masa verde al grupei de animale pentru 6-8 zile.

Numarul de subparcele se determina astfel

Durata de refacere/ durata de pasunat + 1

$$36/6 + 1 = 7$$

Se are în vedere că durata de refacere este mai mică la începutul sezonului de pășunat, iar durata de pasunat poate fi mai mare se recomanda a se organiza pasunatul în 4 cicluri pe trupurile în care durata sezonului de pășunat este de 180 zile

Pe fiecare din cele 7 subparcele, se pasuneaza de 4 ori pe parcursul sezonului de pasunat

Marimea unei subparcele de determina impartind la 7 suprafata parcelei de exploatare.

Organizarea pasunatului pentru cele 3 cazuri este redată în tabelul de mai jos

	TARLALE							
Ciclul 1	1	2	3	4	5	6		
zile de pasunat	1 8	9 16	17 24	25 32	33 40	41 48		
Ciclul 2	1	2	3	4	5	6		
zile de pasunat	49 56	57 64	65 72	73 80	81 88	89 96		
Ciclul 3	1	2	3	4	5	6		
zile de pasunat	97 104	105 112	113 120	110 117	118 125	126 133		
Ciclul 4	1	2	3	4	5	6		
zile de pasunat	134 141	142 149	150 157	158 165	166 173	174 180		

Ordinea de pășunat a subparcelor de exploatare este determinată de expoziție, altitudine și amplasare față de căile de acces. În general, parcelele cu o expoziție însorită și cu altitudinea cea mai mică se vor pășuna primele, după care se valorifică cele cu expoziție umbră sau situate la altitudini mai mari, rezultând calendarul de pășunat pe cicluri de exploatare.

Pajiștile deținute de gospodăriile populației sunt compuse din suprafețe mici și exploatare individual și în cele mai multe cazuri ca folosință mixtă urmărind asigurarea necesarului de masă verde și de fân.

6.6 Căi de acces

La fiecare corp de pajiști există un drum de acces pe care să poată circula mijloace auto și mecanizate, ca să efectueze în bune condiții, în sezonul primăvară – vară - toamnă, toate transporturile necesare. De la drumul principal de acces la corpul de pajiști sunt deschise și se vor amenaja drumuri în continuare, pe cât posibil la toate trupurile de pajiști, iar în interiorul fiecărui trup se vor amenaja drumuri sau căi de acces simple, până la adăposturile de animale, la adăpători, depozite de furaje, etc.

La proiectarea și execuția drumurilor pastorale se ține seama de unele criterii și anume:

- drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere, turistice etc.
- să deservească și să ofere posibilități de acces la o cât mai mare suprafață de pajiști;
- să traverseze cât mai puține văi și pâraie, în vederea reducerii volumului lucrărilor de artă, poduri, podețe etc. și să evite complet locurile înmlăștinite;
- să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajiști și în interiorul acestuia cel puțin pe porțiunile cu pantă;
- să solicite un cost redus pe fiecare kilometru, spre a se putea cu aceleași investiții, în timp mai scurt, să se facă mai multe drumuri, ținând seama că astăzi sunt foarte multe corpuri de pajiști izolate complet de orice cale de comunicație, a căror exploatare este legată în cel mai înalt grad de existența acestora.

Nu în toate cazurile și în toate locurile se simte nevoia existenței unui drum carosabil, deoarece circulația oamenilor și animalelor de la un trup de pajiște la altul sau de la un punct la altul din cadrul aceluiași trup se poate face și pe poteci simple. Circulația pe poteci scurtează distanța dintre două puncte. La amenajarea de noi poteci se ține seama ca acestea să fie cât mai ușor de executat, să fie ușor de parcurs, care să îndulcească panta acolo unde este cazul, atât pentru oameni cât și pentru animale.

6.7 Construcții zoopastorale și surse de apă

În fiecare trup de pajiste unde există construcții zoopastorale și anume stana sau soproane și padocuri pentru adăpostirea animalelor.

Asigurarea cu apă de băut este o condiție indispensabilă pentru realizarea pășunatului rațional.

Se cunoaște că nu se poate face o valorificare superioară a masei verzi prin pășunat, fără ca animalele de toate vârstele și categoriile să aibă la dispoziție apă de băut în cantități îndestulătoare, de bună calitate și în orice perioadă a zilei. Prin apă bună de băut se înțelege o apă curată, lipsită de orice impurități fără miros sau gust deosebit. În zona montană și alpină în general nu se pune problema că nu există apă, adăpatul animalelor se face la ape curgătoare, pâraie și la adăpători amenajate. Munții sunt brăzdați în toate direcțiile de pâraie și nu constituie o problemă adăpatul animalelor la această sursă, dacă apa este limpede, dacă pârâul are fundul pietros, debit suficient și mai ales dacă pe porțiunea de adăpare se fac unele mici amenajări, cale largă de acces, curățirea pârâului de bolovani, etc

În general se socotește că 1 UVM în sezonul de pășunat are nevoie 30-40 litri apă/zi vara și de 15 - 20 litri în cursul primăverii și al toamnei. Pentru o oaie adultă se socotește 2 - 4 l/cap/zi în perioada pășunatului.

Toate trupurile de pajisti au amenajate adăpatori .

De asemenea există posibilitatea adăpării din pâraiele care strabat pajistile



7. DESCRIERE PARCELARĂ

7.1 Trupurile de pajistii si unitatile de exploatare

Suprafata de pajisti de 883,24 ha este organizata in 73 unități de exploatare.

Pentru fiecare trup de pajiste se descriu datele privind altitudinea, expozitia , panta, relieful, tipul de sol, gradul de acoperire a pajistii, incarcatura de animale, compositia floristica, vegetatia lemnoasa, lucrari executate, lucrari propuse:

Tabelul 2.1

Nr. crt.	Trup de pajiste	Suprafata trup (ha)	Parcela descrip- tiva/fertilizare	Suprafata parcela (ha)
0	1	2	3	4
1	Trup Valea Cheli	16.52	1	16.52
2	Trup Saracinești	48.94	2	18.20
			3	11.53
			4	19.21
3	Trup Bunesti	9.15	5	2.75
			6	6.40
4	Trup Vezuri	59.73	7	21.60
			8	38.13
5	Trup Rude	15.77	9	15.77
6	Trup Vlaicu Vale+Deal	40.43	10	15.20
			11	13.89
			12	11.35
7	Trup Parlacu	25.75	13	25.75
8	Trup Mosoroasa-Paraula	24.42	14	24.42
9	Trup Sanda	19.21	15	19.21
10	Trup Camp Saracinești	64.88	16	20.85
			17	44.03
11	Trup Coasta Luncii	7.72	18	7.72
12	Trup Muscel	10.35	19	10.35
13	Trup Valea Cheii	9.43	20	9.43

14	Trup Bradeanu	12.05	21	12.05
15	Trup Poenile Ceausestilor	5.46	22	5.46
16	Trup Lazut	5.02	23	5.02
17	Trup Aninis	7.54	24	7.54
18	Trup Magher	12.14	25	12.14
19	Trup Valea Cometului	24.17	26	24.17
20	Trup La Troita	4.25	27	4.25
21	Trup Plopsor-Intre Vii-Lacul Secerat	26.00	28	26.00
22	Trup Dealul lui Iepure	6.16	29	6.16
23	Trup Fantana Matusii	1.18	30	1.18
24	Trup Ruget	16.95	31	16.95
25	Trup Dos + Valeaa Viei	7.29	32	7.29
26	Trup Oromulu	1.50	33	1.50
27	Trup Portari	5.76	34	5.76
28	Trup Gibulescu	4.08	35	4.08
29	Trup Ergulesti	7.48	36	7.48
30	Trup Lilieci	3.45	37	3.45
31	Trup Fantana lui Bajan	4.20	38	4.20
32	Trup Neamtu	6.01	39	6.01
33	Trup Brezana	2.42	40	2.42
34	Trup Balanesti	3.27	41	3.27
35	Trup Valea Humii	4.28	42	4.28
36	Trup Coasta Luncii	6.01	43	6.01
37	Trup Hogesti	2.54	44	2.54
38	Trup Lacul lui Bajan	2.29	45	2.29
39	Trup Pietrari	13.67	46	13.67
40	Trup Coasta	7.10	47	7.10
41	Trup Bratan	5.81	48	5.81
42	Trup Sub Barzei	3.73	49	3.73
43	Trup Geana	2.92	50	2.92
44	Trup Dealul Inalt	2.20	51	2.20
45	Trup Dealul Popii	13.19	52	5.67
			53	7.52
46	Trup Nisip	2.07	54	2.07

47	Trup Curaturi	16.78	55	16.78
48	Trup Sulgerie	1.79	56	1.79
49	Trup Mutuligesti	5.51	57	2.51
			58	3.00
50	Trup Mandoiu	8.22	59	3.95
			60	4.27
51	Trup Valea de Case	13.71	61	8.85
			62	4.86
52	Trup Floricel	5.84	63	5.84
53	Trup Plese	8.20	64	2.67
			65	2.92
			66	2.61
54	Trup Balanu-Secaturi	34.61	67	34.61
55	Trup Socet	5.22	68	5.22
56	Trup Corlate	26.15	69	4.75
			70	21.40
57	Trup Pod	8.02	71	8.02
58	Trup Livezi	34.59	72	34.59
59	Trup Malul Caprei	3.20	73	3.20
60	Trup Sub Vil	2.87	74	2.87
61	Trup Sub Trand	7.32	75	7.32
62	Trup Prisaci	6.18	76	6.18
63	Trup Apa Sarata	3.90	77	3.90
64	Trup Moara lui Purece	1.29	78	1.29
65	Trup Lot	3.78	79	3.78
66	Trup Podu Rosu	2.73	80	2.73
67	Trup Vale Sangerisului	6.01	81	6.01
68	Trup Fantana Rece	5.02	82	5.02
69	Trup Capul Dealului	29.70	83	7.54
			84	22.15
70	Trup Surle+Viezuini	24.95	85	24.95
71	Trup Zbriglezi	13.79	86	7.52
			87	6.27
72	Trup Ciolpani	5.91	88	5.91
73	Trup Pariul lui Vilau	13.48	89	6.52
			90	6.96
TOTAL		883.24		

7.2 Descrierea unităților de exploatare

1. TRUPUL 1, unitatea de exploatare 1 – VALEA CHEII

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI- MĂGLASI	Trup Valea Cheii	1	16,52	PASUNE	Versant complex	Inclinată
Altitudine:	380-460	Expozitie:	NE(umbrit)			Inclinatie: 12(03-22)
Sol:	Eutricambosol tipic,Preluvosol stagnic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca pratensis-Poa pratensis,Juncus effusus					
Graminee:	Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pretensis (coada vulpii), Phleum pratense (timofitică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorim intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:			Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).			
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:				85%		
Incarcarea cu animale:				0,581		
Vegetatia lemnoasa:				Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Populus alba(plop), , Tilia cordata(tei), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).		
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu						

tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

2. TRUPUL 2, unitatea de exploatare 2 – SARACINESTI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Saracinești	2,3,4	48,94	PASUNE	Microbazinet de versant, versant superior	Inclinată
Altitudine: 380-500 380-450 400-500		Expozitie: E(semiumbrita) E(semiumbrita) E(semiumbrita)			Inclinatie: 12(03-42) 07(03-30) 17(03-30)	
Sol:		Regosol calcaric-static, Regosol eutric				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Agrostis copillaris-Festuca rupicola, Festuca pratensis-Poa pratensis,Juncus effusus				
Graminee:		Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboșica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (frăgi), <i>Eryngium campestre</i> (scalul dragului).		
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoale), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).		
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%		
Incarcarea cu animale:	0,741		
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).		
Lucrari executate:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase		
Lucrari propuse:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.		

3. TRUPUL 3, unitatea de exploatare 3 – BUNESTI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI- MĂGLASI	Trup Bunesti	5,6	9,15	PASUNE	Sector superior de verant, neuniform	Inclinată
Altitudine:	540-640 540-600	Expozitie:	S(insorita) V(semiansorita)		Inclinatie:	30(22-42) 12(03-30)
Sol:	Regosol eutric, Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Nardus stricta					
Graminee:	Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca atroides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță măruntă), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timofică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunt), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scalul dracului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:		0,516				
Vegetatia lemnoasa:		Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).				
Lucrari executate:						

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

îndepărtarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

îndepărtarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsămăntarea dacă va fi cazul și reinsămăntarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

4. TRUPUL 4, unitatea de exploatare 4 - VIEZURI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Viezuri	7,8	59,73	PASUNE	Culme îngusta, versant cu aspect de microbazinet	Inclinată
Altitudine:	450-570 360-460	Expozitie:	SV(însorit) S(însorita)		Inclinatie:	07(03-30) 12(03-22)
Sol:	Eutricambosol tipic, Regosol calcaric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola,Festuca pratensis-Poa pratensis					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronila varia (coroniște).					

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea milefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboșica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorim intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (frăgi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).		
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoale), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).		
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%		
Încarcarea cu animale:	0,712		
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crategus monogyna</i> (paducea), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).		
Lucrari executate:			
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase			
Lucrari propuse:			
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.			

5. TRUPUL 5, unitatea de exploatare 5 – RUDE

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Rude	9	15,77	PASUNE	Microbazinet de versant	Inclinată
Altitudine:	370-470	Expozitie:	SE(semiianSORita)		Inclinatie:	12(03-17)
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca pratensis-Poa pratensis					
Graminee:	Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvestre), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:		0,705				
Vegetatia lemnoasa:		Fagus silvatica(fag), , Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).				
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.						
indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi						

pentru umbrar;
combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.
indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;
combaterea buruienilor;
combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;
amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;
suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redote in urma lucrarilor ameliorative;
fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

6. TRUPUL 6, unitatea de exploatare 6 – VLAICU VALE+DEAL

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Vlaicu vale+deal	10,11,12	40,43	PASUNE	Versant neuniform, mijlociu si inferior de versant	Inclinată
Altitudine:	360-420 380-510 350-370	Expozitie:	V(semiansorita) N(umbrita) -		Inclinatie:	17 17 7
Sol:	Eutricambosol tipic, Preluvosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia găii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorim intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					

Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoale), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,654
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avelana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (măces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

7. TRUPUL 7, unitatea de exploatare 7 – PARLACU

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Parlacu	13	25,75	PASUNE	Versant neuniform, mijlociu si inferior de versant	Inclinată
Altitudine:	400-570	Expozitie:	N(umbrita)		Inclinatie:	17(07-30)
Sol:	Preluvosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scalul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrgoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,726			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și fumici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu						

tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

8. TRUPUL 8, unitatea de exploatare 8 – MOSOROASA PARAULA

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Mosoroasa Paraula	14	24,42	PASUNE	Versant neuniform	Inclinată
Altitudine:	420-640	Expozitie:	NV(semiumbrita)		Inclinatie:	17(12-30)
Sol:	Preluvosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Lotus corniculatus (ghizdel), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus				

	<i>repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,690
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus sylvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbur).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

9. TRUPUL 9, unitatea de exploatare 9 – SANDA

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Sanda	15	19,21	PASUNE	Superior si mijlociu de versant	Inclinată
Altitudine:	420-550	Expozitie:	V(semiansorita)		Inclinatie:	17
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia găii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorim intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,581			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(păducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și fumici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.						
indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi						

pentru umbrar;
combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.
indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;
combaterea buruienilor;
combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;
amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;
suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;
fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

10. TRUPUL 10, unitatea de exploatare 10 – CAMP SARACINESTI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Camp Saracinești	16,17	64,88	PASUNE	Versant ne uniform lung	Inclinată
Altitudine:	370-560 370-550	Expozitie:	NV(semiumbrita) V(semiansorita)		Inclinatie:	17(12-30) 17
Sol:	Preluvosol tipic, Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timofitică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre				

	(barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,712
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avelana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn calnesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

11. TRUPUL 11, unitatea de exploatare 11 – COASTA LUNCII

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Coasta Luncii	18	7,72	PASUNE	Versant foarte ne uniform	Inclinată
Altitudine:	470-540	Expozitie:	NV(semiumbrata)		Inclinatie:	17(12-22)
Sol:	Regosol calcaric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					

Graminee:	<i>Agrostis capillaris</i> (iarba câmpului), <i>Festuca rupicola</i> (păiuș de silvostepă), <i>Festuca pratensis</i> (păiuș de livezi), <i>Poa pratensis</i> (firuță), <i>Nardus stricta</i> (teposica), <i>Festuca rubra</i> (păiuș roșu), <i>Festuca supina</i> (părușcă), <i>Festuca airoides</i> (părușcă), <i>Poa alpina</i> (firuța alpină), <i>Poa annua</i> (firuță mărunță), <i>Alopecurus pratensis</i> (coada vulpii) , <i>Phleum pratense</i> (timoftică), <i>Botriochloa ischemum</i> (bărboasă), <i>Deschampsia caespitosa</i> (târsă).	
Leguminoase:	<i>Trifolium repens</i> (trifoi alb), <i>Medicago lupulina</i> (trifoi mărunț), <i>Astragalus lanatus</i> (unghia gaili), <i>Lotus corniculatus</i> (ghizdei), <i>Coronilla varia</i> (coroniște).	
Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea mlfefoltum</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).	
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoale), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).	
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%	
Incarcarea cu animale:	0,690	
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus sylvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avelana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crategus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).	
Lucrari executate:		
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase		
Lucrari propuse:		
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.		

12. TRUPUL 12, unitatea de exploatare 12 – MUSCEL

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Muscel	19	10,35	PASUNE	Versant foarte ne uniform	Inclinată
Altitudine: 540-600		Expozitie: V(semiansorita)			Inclinatie: 12	
Sol: Eutricambosol tipic						
Date stationare suplimentare (daca este cazul):-						
Tip de pajiste:		Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia				
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparceta), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(cluboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scalul dragului).				
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrgoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,530			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.						

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;
combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

13. TRUPUL 13, unitatea de exploatare 13 – VALEA CHEII

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie	
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Valea Cheii	20	9,43	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată	
Altitudine:		350-420	Expozitie:		E(semiumbrita)	Inclinatie:	12(07-30)
Sol:		Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -							
Tip de pajiste:		Festuca pratensis-Poa pratensis					
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Poa pratensis (firuță), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdel), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboșica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre					

	(barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,697
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avelana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

14. TRUPUL 14, unitatea de exploatare 14 – BRADEANU

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Bradeanu	21	12,05	PASUNE	Microbazinet de versant	Inclinată
Altitudine: 470-610		Expozitie: V(semiansorita)	Inclinatie: 12(07-17)			
Sol:	Preluvosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					

Graminee:	<i>Agrostis capillaris</i> (iarba câmpului), <i>Festuca rupicola</i> (păiuș de silvostepă), <i>Poa pratensis</i> (firuță), <i>Festuca pratensis</i> (păiuș de livezi), <i>Nardus stricta</i> (teposica), <i>Festuca rubra</i> (păiuș roșu), <i>Festuca supina</i> (părușcă), <i>Festuca airoides</i> (părușcă), <i>Poa alpina</i> (firuța alpina), <i>Poa annua</i> (firuță mărunță), <i>Alopecurus pratensis</i> (coada vulpii) , <i>Phleum pratense</i> (timoftică), <i>Botriochloa ischemum</i> (bărboasă), <i>Deschampsia caespitosa</i> (târsă).	
Leguminoase:	<i>Trifolium repens</i> (trifoi alb), <i>Medicago lupulina</i> (trifoi mărunț), <i>Astragalus lanatus</i> (unghia gaii), <i>Lotus corniculatus</i> (ghizdei), <i>Coronilla varia</i> (coroniște).	
Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achilea mlfefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).	
Plante daunatoare si toxice:		<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:		85%
Incarcarea cu animale:		0,690
Vegetatia lemnoasa:		<i>Fagus sylvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avelana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crategus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:		
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase		
Lucrari propuse:		
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.		

15. TRUPUL 15, unitatea de exploatare 15 – POIENILE CEAUSESTILOR

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Poienile Ceausedstilor	22	5,46	PASUNE	Versant relative uniform	Inclinată
Altitudine:	540-600	Expozitie:	V(semiansorita)		Inclinatie:	12
Sol:	Preluvosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Poa pratensis (firuță), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlăgina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:		0,661				
Vegetatia lemnoasa:		Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paduce), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).				
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.						
indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi						

pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase
Lucrari propuse: distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțișe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și musuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

16. TRUPUL 16, unitatea de exploatare 16 – LA ZUT

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup La Zut	23	5,02	PASUNE	Sector superior de versant	Inclinată
Altitudine: 600-610		Expozitie: -		Inclinatie: 7		
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Nardus stricta					
Graminee:	Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Poa pratensis (firuță), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gali), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre				

	(barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,719
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avelana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

17. TRUPUL 17, unitatea de exploatare 17 – ANINIS

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Aninis	24	7,54	PASUNE	Sector superior de versant	Inclinată
Altitudine: 580-610		Expozitie: -			Inclinatie: 7	
Sol:	Regosol eutric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Nardus stricta					

Graminee:	<i>Nardus stricta</i> (teposica), <i>Agrostis capillaris</i> (iarba câmpului), <i>Festuca rupicola</i> (păiuș de silvostepă), <i>Poa pratensis</i> (firuță), <i>Festuca pratensis</i> (păiuș de livezi), <i>Festuca rubra</i> (păiuș roșu), <i>Festuca supina</i> (părușcă), <i>Festuca atroides</i> (părușcă), <i>Poa alpina</i> (firuța alpina), <i>Poa annua</i> (firuță mărunță), <i>Alopecurus pratensis</i> (coada vulpii) , <i>Phleum pratense</i> (timoftică), <i>Botriochloa ischemum</i> (bărboasă), <i>Deschampsia caespitosa</i> (târsă).	
Leguminoase:	<i>Trifolium repens</i> (trifoi alb), <i>Medicago lupulina</i> (trifoi mărunț), <i>Astragalus lanatus</i> (unghia gaili), <i>Lotus corniculatus</i> (ghizdei), <i>Coronilla varia</i> (coroniște).	
Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (cluboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scail dragului).	
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).	
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%	
Incarcarea cu animale:	0,596	
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).	
Lucrari executate:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțișe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțișe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

18. TRUPUL 18, unitatea de exploatare 18 – MAGHER

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Magher	25	12,14	PASUNE	Sector mijlociu de versant	Inclinată
Altitudine:		440-520	Expozitie: SV(insorita)		Inclinatie:	12(03-22)
Sol:		Preluvosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Nardus stricta				
Graminee:		Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Poa pratensis (firuță), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca atroides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).				
Plante daunatoare si toxice:			Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).			
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,712			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și fumici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.						
indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi						

pentru umbrar;
combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.
indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;
combaterea buruienilor;
combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;
amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;
suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;
fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

19. TRUPUL 19, unitatea de exploatare 19 – VALEA CONETULUI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie	
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Valea Conetului	26	24,17	PASUNE	Versant neuniform	Inclinată	
Altitudine:		450-590	Expozitie:		V(semiansorita)	Inclinatie:	12(07-22)
Sol:		Preluvosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -							
Tip de pajiste:		Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:		Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Nardus stricta(teposica), Poa pratensis (firuță), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdel), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(cluboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre					

	(barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,596
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avelana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul și reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

20. TRUPUL 20, unitatea de exploatare 20 – LA TROITA

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup La Troita	27	4,25	PASUNE	Sector superior de versant	Inclinată
Altitudine:	590-610	Expozitie:	-		Inclinatie:	7
Sol:	Regosol eutric					
Date stationare suplimentare (dacă este cazul): -						
Tip de pajiste:	Nardus stricta					

Graminee:	<i>Nardus stricta</i> (teposica), <i>Agrostis capillaris</i> (iarba câmpului), <i>Festuca rupicola</i> (păiuș de silvostepă), <i>Poa pratensis</i> (firuță), <i>Festuca pratensis</i> (păiuș de livezi), <i>Festuca rubra</i> (păiuș roșu), <i>Festuca supina</i> (părușcă), <i>Festuca airoides</i> (părușcă), <i>Poa alpina</i> (firuța alpină), <i>Poa annua</i> (firuță mărunță), <i>Alopecurus pratensis</i> (coada vulpii) , <i>Phleum pratense</i> (timoftică), <i>Botriochloa ischemum</i> (bărboasă), <i>Deschampsia caespitosa</i> (târsă).	
Leguminoase:	<i>Trifolium repens</i> (trifoi alb), <i>Medicago lupulina</i> (trifoi mărunț), <i>Astragalus lanatus</i> (unghia galii), <i>Lotus corniculatus</i> (ghizdei), <i>Coronilla varia</i> (coroniște).	
Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scalul dragului).	
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).	
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%	
Incarcarea cu animale:	0,523	
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).	
Lucrari executate:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

21. TRUPUL 21, unitatea de exploatare 21 – PLOPSOR INTRE VII-LACUL SECERAT

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Plopsor-Intre Vii-Lacul Secerat	28	26,00	PASUNE	Sector mijlociu de versant foarte neuniform	Inclinată
Altitudine: 430-590		Expozitie: SV(insorita)			Inclinatie: 17(03-30)	
Sol:		Eutricambosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia				
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Poa pratensis (firuță), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(cluboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scail dragului).				
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,530			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbuști;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

22. TRUPUL 22, unitatea de exploatare 22 – DEALUL LUI IEPURE

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Dealul lui Iepure	29	6,16	PASUNE	Sector mijlociu de versant	Inclinată
Altitudine: 410-460		Expozitie: S(însorita)			Inclinatie: 17(12-30)	
Sol:		Regosol eutric				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia				
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silveste), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Poa pratensis (firuță), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(cluboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlăgina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaul dragului).				

Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,523
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

23. TRUPUL 23, unitatea de exploatare 23 – FANTANA MATUSII

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Fantana Matusii	30	1,18	PASUNE	Sector superior de versant	Inclinată
Altitudine:	520-550	Expozitie:	V(semiansorita)		Inclinatie:	12
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia					
Graminee:	Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Poa pratensis (firuță), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timofitică), Botriochloa ischemum (bârboasă), Deschampsia caespitosa (târșă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Lotus corniculatus (ghizdel), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrgoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,618			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu						

tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și musuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

24. TRUPUL 24, unitatea de exploatare 24 – RUGET

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Ruget	31	16,95	PASUNE	Versant foarte neuniform	Inclinată
Altitudine: 520-550		Expozitie: V(semiansorita)			Inclinatie: 12	
Sol:		Eutricambosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia				
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Poa pratensis (firuță), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă),				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia găii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboșica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).				

Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,690
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

25. TRUPUL 25, unitatea de exploatare 25 – DOS+VALEA VIEI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Dos + Valea Viei	32	7,29	PASUNE	Sector mijlociu de versant valurit	Inclinată
Altitudine:	350-400	Expozitie:	S(insorita)		Inclinatie:	12(07-17)
Sol:	Regosol calcaric-molic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca pratensis-Poa pratensis					
Graminee:	Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Poa pratensis (firuță), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:	Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).					
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%					
Incarcarea cu animale:	0,574					
Vegetatia lemnoasa:	Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).					
Lucrari executate:						

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

26. TRUPUL 26, unitatea de exploatare 26 – OROMULU

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Oromulu	33	1,5	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată
Altitudine: 320-340		Expozitie: S(însorita)			Inclinatie:	12
Sol:		Regosol distric				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca rupicola- Poa pratensis				
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silvestepă), Poa pratensis (firuță), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timofitică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronila varia (coroniște).				

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (frăgi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,690
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paduce), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; supraînsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative; fertilizarea cu îngrășăminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

27. TRUPUL 27, unitatea de exploatare 27 – PORTARI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Portari	34	5,76	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată
Altitudine: 340-390		Expozitie: S(insorita)			Inclinatie:	07(03-17)
Sol:		Eutricambosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca rupicola- Poa pratensis				
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).				
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,719			
Vegetatia lemnoasa:		Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).				
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și fumici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu						

tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

28. TRUPUL 28, unitatea de exploatare 28 – GHIBULESCU

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Ghibulescu	35	4,08	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată
Altitudine: 350-400		Expozitie: SV(Insorita)			Inclinatie:	12(07-17)
Sol:		Eutricambosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca rupicola- Poa pratensis				
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciubotica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scail dragului).				

Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,676
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

29. TRUPUL 29, unitatea de exploatare 29 – ERGULESTI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Ergulesti	36	7,48	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată
Altitudine: 330-380		Expozitie: SV(insorita)			Inclinatie: 12	
Sol:		Eutricambosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca rupicola- Poa pratensis				
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timofitică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gali), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(cluboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(frăgi), Eryngium campestre (scalul dragului).				
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrgoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,668			
Vegetatia lemnoasa:		Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacăn), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbur).				
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu						

tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

30. TRUPUL 30, unitatea de exploatare 30 – LILIECI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Lilieci	37	3,45	PASUNE	Sector inferior de versant relativ inferior	Inclinată
Altitudine: 380-440		Expozitie: S(însorita)			Inclinatie:	12
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia					
Graminee:	Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca alroides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pretensis (coada vulpii), Phleum pratense (timofică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronila varia (coroniște).					

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pâtlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (frăgi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,668
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

31. TRUPUL 31, unitatea de exploatare 31 – FANTANA LUI BAJAN

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Fantana lui Bajan	38	4,20	PASUNE	Sector mijlociu de versant neuniform	Inclinată
Altitudine: 430-500		Expozitie: S(insorita)			Inclinatie: 07(03-22)	
Sol: Eutricambosol tipic						
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca pratensis-Poa pratensis,Juncus effusus				
Graminee:		Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effusus (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(duboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).				
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Încarcarea cu animale:			0,690			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și musuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și musuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbuști;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

32. TRUPUL 32, unitatea de exploatare 32 – NEAMTU

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Neamtu	39	6,01	PASUNE	Sector mijlociu de versant foarte neuniform	Inclinată
Altitudine: 420-500		Expozitie: SV(însorita)			Inclinatie: 12(03-22)	
Sol:		Eutricambosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca pratensis-Poa pratensis				
Graminee:		Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (tărsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia găii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,647
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus sylvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

33. TRUPUL 33, unitatea de exploatare 33 – BREZANA

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Brezana	40	2,42	PASUNE	Sector mijlociu de versant	Inclinată
Altitudine:	420-460	Expozitie:	S(însorita)		Inclinatie:	12(12-22)
Sol:	Regosol calcaric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca pratensis-Poa pratensis					
Graminee:	Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască), Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:		0,523				
Vegetatia lemnoasa:		Fagus sylvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).				
Lucrari executate:						

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și musuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și musuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbuști;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsămânțarea dacă va fi cazul și reinsămânțarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

34. TRUPUL 34, unitatea de exploatare 34 – BALANESTI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Balanesti	41	3,27	PASUNE	Sector inferior de versant valurit	Inclinată
Altitudine:	350-390	Expozitie:	V(semiansorita)			Inclinatie: 12
Sol:	Regosol calcaric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca pratensis-Poa pratensis					
Graminee:	Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pretensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scailul dragului).	
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).	
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%	
Incarcarea cu animale:	0,545	
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crategus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).	
Lucrari executate:		
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase		
Lucrari propuse:		
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.		

35. TRUPUL 35, unitatea de exploatare 35 – VALEA HUMII

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Valea Humii	42	4,28	PASUNE	Sector inferior de versant valurit	Inclinată
Altitudine:	360-410	Expozitie:	S(însorita)		Inclinatie:	12
Sol:	Regosol calcaric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca pratensis-Poa pratensis					
Graminee:	Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(cluboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:		0,523				
Vegetatia lemnoasa:		Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).				
Lucrari executate:						

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

36. TRUPUL 36, unitatea de exploatare 36 – COASTA LUNCII

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Coasta Luncii	43	6,01	PASUNE	Sector inferior de versant neuniform	Inclinată
Altitudine: 340-400		Expozitie: V(semiansorita)			Inclinatie:	12
Sol:		Regosol calcaric				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca pratensis-Poa pratensis				
Graminee:		Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparceță), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timofică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (togoș), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (cluboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).
Plante daunatoare și toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,712
Vegetația lemnoasă:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbăr).
Lucrări executate:	
distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar; combaterea vegetației lemnoase	
Lucrări propuse:	
distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetației lemnoase, arbori și arbuști; amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative; fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

37. TRUPUL 37, unitatea de exploatare 37 – HOGESTI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Hogesti	44	2,54	PASUNE	Sector inferior de versant neuniform	Inclinată
Altitudine:	340-400	Expozitie:	V(semiansorita)		Inclinatie:	12
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca pratensis-Poa pratensis					
Graminee:	Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(cluboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,654			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tel), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetației lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetației lemnoase, arbori și arbuști;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsămânțarea dacă va fi cazul și reinsămânțarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

38. TRUPUL 38, unitatea de exploatare 38 – LACUL LUI BAJAN

P. TRUPUL 58, unitatea de exploatare 58 – LACUL LUI BAJAN						
U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Lacul lui Bajan	45	2,29	PASUNE	Sector mijlociu de versant	Inclinată
Altitudine: 400-440		Expozitie: S(însorita)			Inclinatie: 12	
Sol:		Eutricambosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca pratensis-Poa pratensis				
Graminee:		Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronila varia (coroniște).				

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pâtlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,705
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

39. TRUPUL 39, unitatea de exploatare 39 – PIETRARI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Pietrari	46	13,67	PASUNE	Sector mijlociu de versant neuniform	Inclinată
Altitudine:	320-420	Expozitie:	NE(umbrita)		Inclinatie:	12(03-22)
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca pratensis-Poa pratensis					
Graminee:	Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firușă), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firușă alpina), Poa annua (firușă mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timofică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboșica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:		0,625				
Vegetatia lemnoasa:		Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilio cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).				
Lucrari executate:						

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbuști;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

40. TRUPUL 40, unitatea de exploatare 40 – COASTA

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Coasta	47	7,10	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată
Altitudine: 320-360		Expozitie: NE(umbrita)			Inclinatie:	12(03-17)
Sol:		Eutricambosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca pratensis-Poa pratensis				
Graminee:		Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achilea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pâtlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).	
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).	
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%	
Incarcarea cu animale:	0,588	
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avelana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).	
Lucrari executate:		
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase		
Lucrari propuse:		
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.		

41. TRUPUL 41, unitatea de exploatare 41 – BRATAN

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Bratan	48	5,81	PASUNE	Sector mijlociu de versant	Inclinată
Altitudine:	370-410	Expozitie:	NE(umbrita)		Inclinatie:	12
Sol:	Regosol eutric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca pratensis-Poa pratensis					
Graminee:	Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timofitică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia găii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucută), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,618			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

42. TRUPUL 42, unitatea de exploatare 42 – SUB BARZEI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Sub Barzei	49	3,73	PASUNE	Sector mijlociu de versant neuniform	Inclinată
Altitudine: 400-430		Expozitie: N(umbrita)			Inclinatie:	17(03-22)
Sol:		Regosol eutric				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Agrostis capillaris-Festuca rupicola				
Graminee:		Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlăgîna), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).		
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).		
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%		
Incarcarea cu animale:	0,530		
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus sylvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).		
Lucrari executate:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase		
Lucrari propuse:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul și reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.		

43. TRUPUL 43, unitatea de exploatare 43 – GEANA

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI- MĂGLASI	Trup Geana	50	2,92	PASUNE	Culme secunadara ingusta	Inclinată
Altitudine: 450-470		Expozitie: S(insorita)			Inclinatie: 12(07-12)	
Sol:		Regosol eutric				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia				
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Onobrychis viciifolia (sparcetă), Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(cluboșica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).				
Plante daunatoare si toxice:			Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).			
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Încarcarea cu animale:			0,545			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsămantarea dacă va fi cazul și reînsemantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

44. TRUPUL 44, unitatea de exploatare 44 – DEALUL ÎNALT

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Dealul Inalt	51	2,20	PASUNE	Culme secundara ingusta si versant insotitor	Inclinată
Altitudine: 450-470		Expozitie: S(insorita)			Inclinatie: 12(07-12)	
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia					
Graminee:	Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță măruntă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Onobrychis viciifolia (sparcetă),Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunt), Astragalus lanatus(unghia gali), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).		
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).		
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%		
Incarcarea cu animale:	0,516		
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).		
Lucrari executate:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase		
Lucrari propuse:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.		

45. TRUPUL 45, unitatea de exploatare 45 – DEALUL POPII

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Dealul Popii	52,53	13,19	PASUNE	Valcea in cadrul versantului, versant neuniform	Inclinată
Altitudine:	420-470 420-490	Expozitie:	NE(umbrita)		Inclinatie:	7 17
Sol:	Regosol distric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Botriochloa ischaemum					
Graminee:	Botriochloa ischaemum (bărboasă), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timofitică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(ungchia gaii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronila varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achilea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(clubofica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorim intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,545			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinum myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			

Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti; amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative; fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

46. TRUPUL 46, unitatea de exploatare 46 – NISIP

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Nisip	54	2,07	PASUNE	Valcea in cadrul versantului	Inclinată
Altitudine:	430-450	Expozitie:	-		Inclinatie:	7
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Botriochloa ischemum (bărboasă), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea milefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pâtlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).	
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoale), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).	
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%	
Incarcarea cu animale:	0,516	
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).	
Lucrari executate:		
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase		
Lucrari propuse:		
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.		

47. TRUPUL 47, unitatea de exploatare 47 – CURATURI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Curaturi	55	16,78	PASUNE	Sector superior de versant valurit cu microculmi	Inclinată
Altitudine: 520-570		Expozitie: N(umbrita)			Inclinatie:	07(03-22)
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Botriochloa ischaemum					
Graminee:	Botriochloa ischaemum (bărboasă), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timofitică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:			Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).			
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,523			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și fumici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu						

tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

supraînsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

48. TRUPUL 48, unitatea de exploatare 48 – SULGERIE

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Sulgerie	56	1,79	PASUNE	Versant foarte neuniform	Inclinată
Altitudine:	450-480	Expozitie:	N(umbrita)		Inclinatie:	12(07-22)
Sol:	Regosol calcaric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Botriochloa ischaemum					
Graminee:	Botriochloa ischaemum (bărboasă), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timofitică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus				

	<i>repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,712
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

49. TRUPUL 49, unitatea de exploatare 49 – MUTULIGESTI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Mutuligesti	57,58	5,51	PASUNE	Sector mijlociu de versant	Inclinată
Altitudine:	460-510 460-510	Expozitie:	N(umbrita) V(semiansorita)		Inclinatie:	22(17-42) 30(22-42)
Sol:	Regosol calcaric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gali), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scalul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,618			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și fumici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.						

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;
combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

50. TRUPUL 50, unitatea de exploatare 50 – MANDOIU

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Mandoiu	59,60	8,22	PASUNE	Culme secundara si versant insotitor	Inclinată
Altitudine:	360-410 370-410	Expozitie:	E(semiumbrita) V(semiansorita)		Inclinatie:	12(07-22) 12(07-17)
Sol:	Regosol calcaric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlăglna), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scailul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus				

	<i>repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,581
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paduce), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative; fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

51. TRUPUL 51, unitatea de exploatare 51 – VALEA CU CASE

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Valea cu Case	61,62	13,71	PASUNE	Sector mijlociu de versant	Inclinată
Altitudine:	400-450 380-420	Expozitie:	N(umbrita) E(semiumbrita)		Inclinatie:	12(07-22) 22
Sol:	Regosol eutric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță măruntă), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunt), Astragalus lanatus(unghia gail), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrgoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,705			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.						

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;
combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

52. TRUPUL 52, unitatea de exploatare 52 – FLORICEL

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Floricel	63	5,84	PASUNE	Sector superior de versant	Inclinată
Altitudine:	400-500	Expozitie:	N(umbrita)		Inclinatie:	22(12-42)
Sol:	Regosol eutric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(sparz), Equisetum palustre				

	(barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,712
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

53. TRUPUL 53, unitatea de exploatare 53 – PLESE

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI- MĂGLASI	Trup Plese	64,65,66	8,20	PASUNE	Sector superior de versant, mijlociu	Inclinată
Altitudine:	340-390 350-390 350-390	Expozitie:	NE(umbrita) E(semiumbrita) N(umbrita)		Inclinatie:	30 12(07-30) 17
Sol:	Regosol eutric, Preluvosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola,Onobrychis viciifolia					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Onobrychis viciifolia (sparcetă), Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gâii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum{cucuta}, Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,581			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbuști;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

54. TRUPUL 54, unitatea de exploatare 54 – BALANU-SECATURI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Balanu-SecatURI	67	34,61	PASUNE	Culme secundara ingusta	Inclinată
Altitudine:	390-500	Expozitie:	E(semiumbrita)		Inclinatie:	12(03-30)
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					

Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoale), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,705
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus sylvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. îndepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. îndepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti; amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsămânțarea dacă va fi cazul și reinsămânțarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative; fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

55. TRUPUL 55, unitatea de exploatare 55 – SOGET

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie	
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Soget	68	5,22	PASUNE	Sector superior de versant	Inclinată	
Altitudine:		430-500	Expozitie:		E(semiumbrita)	Inclinatie:	07(03-12)
Sol:		Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -							
Tip de pajiste:		Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:		Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunt), Astragalus lanatus(unghia gail), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(dubofica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).					
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%				
Incarcarea cu animale:			0,618				
Vegetatia lemnoasa:		Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paduce), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).					
Lucrari executate:							
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu							

tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

56. TRUPUL 56, unitatea de exploatare 56 – CORLATE

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Corlate	69,70	26,15	PASUNE	Microbazinet de versant, microculme de versant	Inclinată
Altitudine:	500-560 500-560	Expozitie:	E(semiumbrita) N(umbrita)		Inclinatie:	12(07-22) 17(07-22)
Sol:	Regosol eutric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia găii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					

Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,712
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paduce!), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

57. TRUPUL 57, unitatea de exploatare 57 – POD

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI- MĂGLASI	Trup Pod	71	8,02	PASUNE	Microbazinet de versant, microculme de versant	Inclinată
Altitudine: 420-510		Expozitie: N(umbrita)			Inclinatie:	12(07-22)
Sol:		Eutricambosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Agrostis capillaris-Festuca rupicola				
Graminee:		Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta(teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).				
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,690			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de						

vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combateră vegetației lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combateră buruienilor;

combateră vegetației lemnoase, arbori și arbuști;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

58. TRUPUL 58, unitatea de exploatare 58 – LIVEZI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Livezi	72	34,59	PASUNE	Sector mijlociu si superior de versant neuniform	Inclinată
Altitudine: 420-510		Expozitie: N(umbrita)			Inclinatie:	12(07-22)
Sol:		Eutricambosol tipic				
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Nardus stricta				
Graminee:		Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timofică), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunătoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).				

Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrgoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,705
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

59. TRUPUL 59, unitatea de exploatare 59 – MALUL CAPREI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie	
PĂUȘEȘTI- MĂGLASI	Trup Malul Caprei	73	3,20	PASUNE	Sector superior de versant foarte neuniform	Inclinată	
Altitudine:		480-550	Expozitie:		NE(umbrita)	Inclinatie:	17(07-42)
Sol:		Regosol eutric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -							
Tip de pajiste:		Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:		Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Nardus stricta(teposica), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timofitică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronila varia (coroniște).					
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achilea milefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pâtlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).					
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%				
Încarcarea cu animale:			0,552				
Vegetatia lemnoasa:		Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).					
Lucrari executate:							

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbuști;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsămânțarea dacă va fi cazul și reinsămânțarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

60. TRUPUL 60, unitatea de exploatare 60 – SUB VII

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Sub VII	74	2,87	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată
Altitudine: 360-380		Expozitie: E(semiumbrita)			Inclinatie: 17	
Sol: Regosol eutric						
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Agrostis capillaris-Festuca rupicola				
Graminee:		Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Nardus stricta(teposica), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bârboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).				
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia				

	<i>cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,552
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avelana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

61. TRUPUL 61, unitatea de exploatare 61 – SUB TRAND

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Sub Trand	75	7,32	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată
Altitudine:	360-400	Expozitie:	NE(umbrăta)		Inclinatie:	12(07-17)
Sol:	Regosol eutric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Nardus stricta(teposica), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia găii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,596			
Vegetatia lemnoasa:		Fagus sylvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).				
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu						

tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

62. TRUPUL 62, unitatea de exploatare 62 – PRISACI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Prisaci	76	6,18	PASUNE	Sector mijlociu de versant	Inclinată
Altitudine:	370-440	Expozitie:	NE(umbrita)		Inclinatie:	12
Sol:	Preluvosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis capillaris-Festuca rupicola					
Graminee:	Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Nardus stricta(teposica), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(ungchia gaii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus				

	<i>repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,545
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avelana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn calnesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arhusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

63. TRUPUL 63, unitatea de exploatare 63 – APA SARATA

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Apa Sarata	77	3,90	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată
Altitudine: 360-440		Expozitie: NE(umbrita)			Inclinatie: 12	
Sol: Preluvosol tipic						
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Agrostis stolonifera-Agropyron repens				
Graminee:		Agrostis stolonifera (moleață), Agropyron repens (pir târător), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Nardus stricta(teposica), Poa annua (firuță măruntă), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase:		Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunt), Astragalus lanatus(unghia găii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).				
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,661			
Vegetatia lemnoasa:		Fagus sylvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).				
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de						

vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

64. TRUPUL 64, unitatea de exploatare 64 – MOARA LUI PURECE

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Moara lui Purece	78	1,29	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată
Altitudine:	370-400	Expozitie:	NE(umbrita)		Inclinatie:	12(07-17)
Sol:	Aluviosol calcaric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis stolonifera-Agropyron repens					
Graminee:	Agrostis stolonifera (moleață), Agropyron repens (pir târător), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Nardus stricta(teposica), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia				

	<i>cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,603
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Jenuperus communis ssp nana</i> (ienupar pitic) <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

65. TRUPUL 65, unitatea de exploatare 65 – LOT

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Lot	79	3,78	PASUNE	Sector inferior de versant	Inclinată
Altitudine:	420-440	Expozitie:	N(umbrita)		Inclinatie:	12(07-17)
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Agrostis stolonifera-Agropyron repens					
Graminee:	Agrostis stolonifera (moleață), Agropyron repens (pir târâtor), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Nardus stricta(teposica), Poa annua (firuță măruntă), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunt), Astragalus lanatus(unghia galii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunătoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoale), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:		0,610				
Vegetatia lemnoasa:		Fagus sylvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tel), Vaccinium myrtulus(afin),Crategus monogyna(paducei), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn calnesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).				
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe si furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de						

vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

66. TRUPUL 66, unitatea de exploatare 66 – PODUL ROSU

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Podul Rosu	80	2,73	PASUNE	Sector inferior de versant neuniform lung	Inclinată
Altitudine: 420-450		Expozitie: S(însorita)			Inclinatie:	12(07-30)
Sol:	Regosol distric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Nardus stricta					
Graminee:	Nardus stricta(teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firușă), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firușă alpina), Poa annua (firușă mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timofică), Deschampsia caespitosa (tărsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia galii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					

Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,705
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbur).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

67. TRUPUL 67, unitatea de exploatare 67 – VALEA SANGERISULUI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorii de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Valea Sangerisului	81	6,01	PASUNE	Sector mijlociu de versant neuniform	Inclinată
Altitudine:	430-490	Expozitie:	S(insorita)		Inclinatie:	12(07-17)
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Nardus stricta					
Graminee:	Nardus stricta (teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghlздеi), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effusus (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboșica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scalul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,712			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbur).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de						

vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbuști;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsămânțarea dacă va fi cazul și reinsămânțarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

68. TRUPUL 68, unitatea de exploatare 68 – FANTANA RECE

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Fantana Rece	82	5,02	PASUNE	Sector mijlociu de versant traversat	Inclinată
Altitudine:	410-460	Expozitie:	SE(semiinsorita)			Inclinatie: 17(12-22)
Sol:	Regosol distric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Nardus stricta					
Graminee:	Nardus stricta (teposica), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târșă).					
Leguminoase :	Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaii), Onobrychis viciifolia (sparcetă), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunătoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scalul dragului).					

Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoaie), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,719
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

69. TRUPUL 69, unitatea de exploatare 69 – CAPUL DEALULUI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Capul Dealului	83,84	29,70	PASUNE	Sector superior de versant, mijlociu si inferior	Inclinată
Altitudine:	520-620 380-520	Expozitie:	S(Insorita) S(Insorita)		Inclinatie:	17(12-22) 12(07-22)
Sol:	Regosol eutric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia					
Graminee:	Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta (teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timofică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase :	Onobrychis viciifolia (sparcetă), Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunt), Astragalus lanatus(unghia gail), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scalul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:	Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască), Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).					
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%					
Incarcarea cu animale:	0,676					
Vegetatia lemnoasa:	Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crataegus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).					
Lucrari executate:						

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

70. TRUPUL 70, unitatea de exploatare 70 – SURLE+VIEZUINI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Surle+Viezuini	85	24,95	PASUNE	Sector mijlociu si inferior de versant neuniform	Inclinată
Altitudine:	380-500	Expozitie:	SV(însorita)		Inclinatie:	17(12-42)
Sol:	Regosol eutric					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia					
Graminee:	Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta (teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase:	Onobrychis viciifolia (sparcetă), Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					

Diverse plante:	<i>Juncus effuses</i> (pipirig), <i>Carex sp.</i> (rogoz), <i>Achillea millefolium</i> (coada șoricelului), <i>Primula elatior</i> (ciuboțica-cucului), <i>Hypericum maculatum</i> (sunatoare), <i>Thymus sp.</i> (cimbrisor), <i>Cichorium intybus</i> (cicoare), <i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie), <i>Plantago lanceolata</i> (pătlagina), <i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic), <i>Fragaria vesca</i> (fragi), <i>Eryngium campestre</i> (scaiul dragului).		
Plante daunatoare si toxice:	<i>Veratrum album</i> (știrigoale), <i>Pteridium aquilinum</i> (feriga), <i>Euphorbia cyparissias</i> (laptele câinelui), <i>Juncus sp.</i> (pipirig), <i>Ranunculus repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).		
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%		
Incarcarea cu animale:	0,690		
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tel), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Crataegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).		
Lucrari executate:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatiei lemnoase		
Lucrari propuse:	distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.		

71. TRUPUL 71, unitatea de exploatare 71 – ZBRIGLEZI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Zbriglezi	86,87	13,79	PASUNE	Culme îngusta secundara	Inclinată
Altitudine:	420-480 400-480	Expozitie:	SV(insorita) NE(umbrita)		Inclinatie:	12(07-30) 17
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia					
Graminee:	Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta (teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpină), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pretensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase :	Onobrychis viciifolia (sparcetă), Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaili), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorim intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască),Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,588			
Vegetatia lemnoasa:			Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avelana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbar).			
Lucrari executate:						
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de						

vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrari propuse:

distrugerea mușuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti;

amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative;

fertilizarea cu ingrasaminte chimice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

72. TRUPUL 72, unitatea de exploatare 72 – CIOLPANI

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Ciolpani	88	5,91	PASUNE	Sector mijlociu de versant	Inclinată
Altitudine: 370-410		Expozitie: E(semiumbrita)			Inclinatie: 17	
Sol: Eutricambosol tipic						
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:		Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia				
Graminee:		Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta (teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Boerhaavia ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).				
Leguminoase :		Onobrychis viciifolia (sparcetă), Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gail), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronilla varia (coroniște).				
Diverse plante:		Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlagina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scaiul dragului).				
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrgoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus				

	<i>repens</i> (piciorul cocosului), <i>Chelidonium majus</i> (rostopască), <i>Conium maculatum</i> (cucuta), <i>Heleborus orientalis</i> (spanz), <i>Equisetum palustre</i> (barba ursului).
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:	85%
Incarcarea cu animale:	0,596
Vegetatia lemnoasa:	<i>Fagus silvatica</i> (fag), <i>Betula pendula</i> (mesteacan), <i>Corylus avellana</i> (alun), <i>Carpinus betulus</i> (carpin), <i>Quercus robur</i> (stejar), <i>Populus alba</i> (plop), <i>Salix alba</i> (salcie), <i>Tilia cordata</i> (tei), <i>Vaccinium myrtulus</i> (afin), <i>Craegus monogyna</i> (paducel), <i>Rubus idaeus</i> (mur), <i>Ligustrum vulgare</i> (lemn cainesc), <i>Rosa canina</i> (maces), <i>Prunus spinosa</i> (porumbar).
Lucrari executate:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea vegetatici lemnoase	
Lucrari propuse:	
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; combaterea buruienilor; combaterea vegetatiei lemnoase, arbori si arbusti; amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redade in urma lucrarilor ameliorative; fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.	

73. TRUPUL 73, unitatea de exploatare 73 – PARIUL LUI VILAU

U.A.T.	Trup de pajiste Unitatea de exploatare	Parcele descriptive	Suprafata (ha)	Categorie de folosinta	Unitate de relief	Configuratie
PĂUȘEȘTI-MĂGLASI	Trup Pariul lui Vilau	89,90	13,48	PASUNE	Sector mijlociu de versant, inferior	Inclinată
Altitudine:	390-460 380-420	Expozitie:	SE(semiansorita) S(insorita)		Inclinatie:	12(07-17) 22(12-30)
Sol:	Eutricambosol tipic					
Date stationare suplimentare (daca este cazul): -						
Tip de pajiste:	Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia					
Graminee:	Festuca rupicola (păiuș de silvostepă), Agrostis capillaris (iarba câmpului), Festuca pratensis (păiuș de livezi), Poa pratensis (firuță), Nardus stricta (teposica), Festuca rubra(păiuș roșu), Festuca supina (părușcă), Festuca airoides (părușcă), Poa alpina (firuța alpina), Poa annua (firuță mărunță), Botriochloa ischaemum (bărboasă), Alopecurus pratensis (coada vulpii) , Phleum pratense (timoftică), Deschampsia caespitosa (târsă).					
Leguminoase :	Onobrychis viciifolia (sparcetă), Trifolium repens (trifoi alb), Medicago lupulina (trifoi mărunț), Astragalus lanatus(unghia gaii), Lotus corniculatus (ghizdei), Coronila varia (coroniște).					
Diverse plante:	Juncus effuses (pipirig), Carex sp.(rogoz), Achillea millefolium (coada șoricelului), Primula elatior(ciuboțica-cucului), Hypericum maculatum(sunatoare), Thymus sp.(cimbrisor), Cichorium intybus (cicoare), Taraxacum officinalis (păpădie), Plantago lanceolata (pătlăgina), Daucus carota (morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragi), Eryngium campestre (scalul dragului).					
Plante daunatoare si toxice:		Veratrum album (știrigoaie), Pteridium aquilinum (feriga), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Juncus sp.(pipirig), Ranunculus repens(piciorul cocosului), Chelidonium majus (rostopască), Conium maculatum(cucuta), Heleborus orientalis(spanz), Equisetum palustre (barba ursului).				
Grad de acoperire cu vegetatie a parcelei:			85%			
Incarcarea cu animale:			0,588			
Vegetatia lemnoasa:		Fagus silvatica(fag), Betula pendula(mesteacan), Corylus avellana(alun), Carpinus betulus(carpin), Quercus robur(stejar), Populus alba(plop), Salix alba(salcie), Tilia cordata(tei), Vaccinium myrtulus(afin), Crategus monogyna(paducel), Rubus idaeus(mur), Ligustrum vulgare(lemn cainesc), Rosa canina(maces), Prunus spinosa(porumbur).				
Lucrari executate:						

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea vegetatiei lemnoase

Lucrări propuse:

distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârțițe și furnici sau de rădăcinile arborilor doborâți de vânt, precum și mușuroaielor provenite din acumularea de materie vegetală de mușchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.

indepartarea pietrelor și a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolați sau a celor folosiți pentru umbrar;

combaterea buruienilor;

combaterea vegetatiei lemnoase, arbori și arbusti;

amendarea conform măsurilor propuse de OSPA Valcea;

suprainsamantarea dacă va fi cazul și reinsamantarea pe suprafețele redată în urma lucrărilor ameliorative;

fertilizarea cu îngrășăminte chimice și organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA Valcea.

7.3 .Valoarea pastorală

Valoarea pastorală este un indice sintetic de caracterizare a calității unei pajiști, determinată prin stabilirea compoziției floristice pajiștii.

Formula de determinare a valorii pastorale este următoarea:

$$V.P. = \sum PC (\%) \times IC / 5$$

În care :

VP=indicator valoare pastorală (0-100)

PC= participare în covorul ierbos (%)

IC= indice de calitate furajeră

După determinarea indicatorului de valoare pastorală prin împărțirea la 5 a punctajului obținut din înmulțirea PC x IC, acesta se apreciază astfel:

0-5 pajiște degradată

5-15 foarte slabă

15-25 slabă

25-50 mijlocie

50-75 bună

75-100 foarte bună

CAP. 8 . DIVERSE

8.1 Data intrării în vigoare a amenajamentului; Durata acestuia

Data intrării în vigoare : 2020
Durata 10 ani: 2020 - 2030

8.2 Colectivul de elaborare a prezentei lucrări

1. Ing Barbu Marin, consilier superior, Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea –
coordonator

Semnătura.....

2. Ref Andrei Elena, primăria Păușești-Măglași

Semnătura.....

8.3 Hărțile care se atașază amenajamentului pastoral

Se atașază 1 planșe scară 1:10000

8.4 Evidența lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă

Persoanele din cadrul UAT, responsabile cu aplicarea amenajamentului pastoral vor evidenta in fiecare an lucrarile efectuate pe pajisti, conform tabelului 8.1

Datele vor fi preluate din caietele de lucrari pe care utilizatorii de pajisti le vor completa si vor transmite anual o situatie centralizata a lucrarilor efectuate.

Tabelul 8.1.

Nr crt	Trupul de pajiste/ Unitatea de exploatare	Suprafata - ha	Combaterea buruienilor si vegetatiei lemnoase		Strangerea cioatelor, pietrelor si nivelarea musuroaielelor		Grupatul pajistilor		Amendarea pajistilor*		Suprainsamantarea sau reinsamantarea a pajistilor		Fertilizarea pajistilor**		Combaterea eroziunilor	
			anu Perio ada/	Suprafata - ha	anu Perio ada/	Suprafata - ha	anu Perio ada/	Suprafata - ha	anu Perio ada/	Suprafata - ha	anu Perio ada/	Suprafata - ha	anu Perio ada/	Suprafata - ha	anu Perio ada/	Suprafata - ha
3	Trup Valea Cheii	16.52														
4	Trup Saracinesti	48.94														
5	Trup Bunesti	9.15														
6	Trup Vezuri	59.73														
7	Trup Rude	15.77														
8	Trup Vlaicu Vale+Deal	40.43														
9	Trup Parlacu	25.75														
10	Trup Mosoroasa-Paraula	24.42														

Caiet de lucrari

Lucrarea	Detaliere lucrare	Metoda de lucru	Data efectuării Anul, luna	Suprafata ha	Consum de materiale	Observatii
Combaterea buruienilor si vegetatiei lemnoase		manual				
	Combaterea buruienilor	chimic				
	Combaterea vegetatiei lemnoase - arbusti					
	Combaterea vegetatiei lemnoase - arbori					
Strangerea cioatelor, pietrelor si nivelarea musuroaielelor	Nivelarea musuroaielelor					

	Strangerea cloatelor						
	Strangerea pietrelor						
Grăpatul pajistilor							
	Amendarea pajistilor*						
	Supralinsamantarea sau reinsamantarea pajistilor	Supralinsamantarea pajistilor					
	Reinsamantarea						

[illegible]

CALENDARUL LUCRARILOR PE PAJISTILE PERMANANTE

IANUARIE

- Nu se vor realiza insamantari de suprafata sau suprainsamantari.

FEBRUARIE

- In „ferestrele iernii, se face curatirea pajistilor de pietre si resturile lemnoase in urma defrisarii vegetatiei lemnoase daca vremea o permite;
- Vegetatia nedorita trebuie adunata de pe pajiste si indepartata;
- Se curata canalele de desecare pe parcelele cu exces de umiditate, daca solul nu este acoperit;
- Se aplica amendamentele calcaroase pe soluri acide cu teren plan inghetat si a altor amendamente pe saraturi din zona de campie;
- Se aplica ingrasamintele chimice complexe din formele 16-16-16 sau 22-11-11 (NPK) pe pajistile permanente si temporare pe sol inghetat si plan, indeosebi unde se doreste inceperea pasunatului mai devreme;
- Se fac reparatii la sistemele de combatere a eroziunii solului (cleionaje, palisade, terase etc.), daca vremea si conditiile de sol o permit;

ATENTIE!

Se INTERZICE pasunatul in „ferestrele iernii, indeosebi cu oile si caprele daca aceasta duce la degradarea solului si rarirea covorului ierbos.

MARTIE

- Se continua defrisarea vegetatiei lemnoase, daca este cazul;
- Se imprastie musuroaiele, se aduna pietrele si se niveleaza terenul;
- Se continua, daca este cazul, aplicarea amendamentelor pe parcelele saraturate;
- Se elimina excesul de umiditate temporara prin canale de desecare si excesul

permanent prin drenaje;

- Se continua aplicarea ingrasamintelor chimice dupa topirea zapezii, dupa caz.
- Se construiesc sau se refac drumurile de acces pe pasune;
- Se verifica sursa de apa, in vederea asigurarii apei pentru adapat pentru animale.
- Se vor realiza, acolo unde este cazul, constructii usoare pentru adapostirea animalelor, iar in cazul in care acestea exista se va trece la dezinfectarea si repararea lor.
- Se vor repara si dezinfecta stanele, etc.

APRILIE

- Se incheie actiunile de indepartare a vegetatiei lemnoase daunatoare, de imprastiere a musuroaielor si de a nivelare a terenului;
- Se incheie aplicarea amendamentelor;
- Se fac lucrarile de imbunatatiri funciare (combaterea eroziunii, eliminarea excesului de umiditate etc);
- Se continua aplicarea ingrasamintelor chimice, daca este cazul.
- Se intensivizeaza lucrarile de suprainsamantare sau reinsamantare a pajistilor cu covor ierbos degradat;
- Se elimina crengile uscate si se plombeaza scorburi la arborii izolati de pe pasuni;
- Se finalizeaza lucrarilor de plantare a arborilor pentru umbra si imprejmuirea lor;
- Se fac reparatii la alimentarele cu apa (puturi, jgheaburi etc) podete, drumuri, garduri de imprejmuire, adaposturi pentru animale, stani si alte dotari pentru sezonul de pasunat;
- Incepere sezonul traditional de pasunat pe izlazurile comunale si pasuni comune dupa data de 23 aprilie (Sf. Gheorghe) si respectarea pasunatului rational pe specii

si categorii de animale.

MAI

- Incepe campania de combatere a principalelor buruieni din pajistile permanente.
- Se continua lucrarile de imbunatatiri funciare (combaterea eroziunii, eliminarea excesului de umiditate etc);
- Se continua aplicarea ingrasamintelor chimice, daca este cazul.
- Se intensiveaza lucrarile de suprainsemantare sau reinsamantare a pajistilor cu covor ierbos degradat;
- Se respecta pasunatul cu speciile de animale (oi, vaci, cai) stabilite anterior, pentru a preveni reducerea potentialului productiv al pajistii si afectarea calitatii acesteia.

ATENTIE!

- **Utilizatorii de pajisti au obligatia sa respecte incarcatura maxima de animale pe hectar de 0,3 UVM.**
- **Trebuie sa se asigure o densitate optima pe intreaga suprafata (CP x suprafata pajistii), pentru prevenirea pasunatului excesiv, care conduce la refacerea ratei de refacere a pasunii, scaderea productiei de iarba si a cantitatii de iarba consumate de animale in ciclurile urmatoare de pasunat.**
- **Planificarea succesiunii de pasunat a parcelelor se face cu respectarea urmatoarelor criterii:**
 - α . conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din cand in cand este modificat.
Astfel, animalele nu stau in acelasi loc, ci pasuneaza pe locuri diferite;
 - β . pasuntaul in front se face prin dirijarea animalelor pe pasune de catre un cioban ce le permite inaintarea pe masura consumarii plantelor;
 - χ . pasunatul liber (continuu) se poate simplifica acolo unde parcelarea este redusa

la 1-2 parcela delimitate prin bariere naturale (canal, albia unui rau, garduri de arbusti, etc.), drumuri, semnae conventionale sau prin garduri, cu implicatii directe asupra diminuarii cheltuielilor ocazionale de parcelare si alimentare cu apa.

IUNIE

- Se continua campania de combatere a principalelor buruieni din pajistile permanente.
- Incepe recoltarea fanetelor pentru pajistile fara masuri de agromediu.

ATENTIE!

- Pe parcelele unde se va face cosire aceasta operatiune trebuie efectuata pana la 1 Iulie, realizata in etape. O banda necosita de 3 m va fi lasata pe marginile fiecarei parcele. Aceasta banda poate fi cosita dupa 1 septembrie.

IULIE

- Cositul se va realiza dinspre interiorul pazei spre exteriorul acesteia. O banda necosita sau nepasunata de 3 m va fi lasata pe marginile fiecarei parcele. Aceasta band poate fi cosita/pasunata dupa 1 Septembrie;
- In cazul folosirii mixte, pasunatul este permis dupa prima coasa.

AUGUST

- Resturile neconsumate de animale pot fi cosite si se pot imprastia dejectiile dupa fiecare ciclu de pasunat;

ATENTIE!

- Agricultorii care utilizeaza pajistile permanente nu trebuie sa arda vegetatia, inclusiv iarba ramasa dupa cositul pajistii, obiectivul acestei conditii fiind

menținerea unui nivel minim de întreținere a solului prin protejarea pajistilor permanente.

SEPTEMBRIE

ATENȚIE!

- Menținerea pajistilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau cosirea lor cel puțin o dată pe an;
- Nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole;
- Niciun tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe terenurile cu apă în exces pe terenuri înghețate sau acoperite cu zăpadă (Ordin Comun 1182/1270/2005, cerințe pentru zonele vulnerabile la nitrați);
- Nu vor fi folosiți fertilizanti în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicații:

Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă;

Fertilizator lichid – nu mai aproape de 3- m de apă;

În apropierea stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față de stația de captare a apei.

OCTOMBRIE

- La sfârșitul lunii se încheie sezonul de pasunat.

NOIEMBRIE

- Este INTERZIS a se intra cu animalele în pajiste dacă aceasta duce la degradarea solului și rărirea covorului ierbos.

DECEMBRIE

- Este INTERZIS a se intra cu animalele in pajiste **daca aceasta duce la degradarea solului si rarirea covorului ierbos.**

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Marusca T., Mocanu V., Has E.C., Tod Monica A., Andreoiu Andeea C., Dragos Marcela M., Blaj V.A., Ene T.A., Silistru Doina, Ivhim E., Zevedei P.M., Constantinescu C.S., Tod S.V., 2014. *Ghid de Intocmire a Amenajamentelor Pastorale*, Ed. Capolavoro, Brasov, ISBN 978-973-98711-8-1.

<http://www.pajisti-grassland.ro/proiecte/lucrari/index.html>

<http://www.madr.ro/>

<http://www.apia.org.ro/>

ANEXE

Planuri de situație – 1:10000 1 planse format A1

ANEXE –in format electronic

Lista deținătorilor de pajiști.

Lista blocurilor fizice si persoanelor care au depus cereri de suprafata la APIA in anul